Dane aktualne na dzień: 19-03-2024 13:50

Link do produktu: https://redmed.pl/cobas-h232-przenosny-analizator-kardiologiczny-poct-p-1626.html



Cobas H232 - przenośny analizator kardiologiczny POCT

Cena	**7 452,00 zł**
Dostępność	**Czekamy na dostawę**
Czas wysyłki	**do 7 dni**

Opis produktu

Analizator kardiologiczny Cobas H232 pozwala na ukierunkowaną i szybką diagnostykę chorób układu sercowo-naczyniowego. Testy 5 markerów sercowych przy użyciu różnych, jednorazowych pasków testowych. Dzięki małym rozmiarom Cobas H232 można przeprowadzać testy w ramach diagnostyki stanów nagłych czy rutynowej kontroli bezpośrednio w gabinecie czy na oddziale ratunkowym i używać poza laboratorium.

Oznaczenie aktualnych wartości: troponina T, mioglobina, CK-MB, D-dimer i NT-proBNP.

Wyniki z próbki heparynizowanej krwi żylnej.
Czas trwania pomiaru 8-12 minut.
Precyzyjne wyniki z wysoką zgodnością w stosunku do w pełni automatycznych metod laboratoryjnych.

Najważniejsze cechy Analizatora Cobas H232

Precyzyjne, lekkie i poręczne urządzenie.
Automatyczna kalibracja.
Intuicyjna obsługa, urządzenie prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces badania.
Oszczędność kosztów dzięki zastosowaniu pojedynczych testów.

Cobas H232 ma zastosowanie zależnie od wybranego paska testowego:

- diagnoza i kontrola zawału mięśnia sercowego,
- kardiomiopatii,
- wykrycie i ocena stopnia niewydolności serca, zakrzepicy żył głębokich,
- diagnostyka przebytego zawału serca
- zakrzepicy żył głębokich

Dane techniczne analizatora Cobas H232

- Zakres pomiarowy:
  - Troponina T: 40 - 2,000 ng/L; czas testu: 12 min.
  - NT-proBNP: 60 - 9,000 pg/mL; czas testu: 12 min.
  - CK-MB: 1,0 - 40 ng/mL; czas testu: 12 min.
  - D-Dimer: 0,1 - 4,0 µg/mL; czas testu: 8 min.
  - Mioglobina: 30 - 700 ng/mL; czas testu: 8 min.
- Mniej niż 20 sekund czasu nagrzewania po uruchomieniu
- Automatyczne wyłączanie (1 do 60 minut, możliwość programowania)
- Wymiary: 27,5 x 10,2 x 5,5 cm
- Waga: ok. 650g
- Materiał do badania: nieheparynizowana krew żylna pełna
- Ilość krwi: 150 µL