

Link do produktu: <https://redmed.pl/mononucleosis-mononukleoz-a-test-kasetowy-przeciwcia-l-wirusa-epstein-barr-ebv-20-szt-p-1558.html>



## Mononucleosis - Mononukleoz-a - Test kasetowy przeciwcia-l wirusa Epstein-Barr (EBV) - 20 szt.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Czas wysy-lki    | <b>Zadzwo-n 32 720 62 10</b> |
| Numer katalogowy | <b>252003N-20</b>            |
| Producent        | <b>nal von minden</b>        |

### Opis produktu

**Wyr-b medyczny przeznaczony do profesjonalnego u-ytkownika, wed-lug definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych.** Testy **nie s-ą** przeznaczone do u-ytku domowego. Zakup mo-żliwy wy-l-cznie przez osoby posiadaj-ce **PWZ** lub przez firm-ę, podaj-ć nr NIP w zam-ówieniu. W przypadku zakupu przez "u-ytkownika domowego", zam-ówienie zostanie anulowane, a w przypadku wp-l-ty zostanie ona zwr-ócona na konto.

Test immunochromatograficzny do jako-ściowego oznaczania heterofilnych przeciwcia-l przeciw wirusowi EBV w ludzkich prób-kach krwi pełnej, surowicy lub osocza. Test ten mo-że by-ć pomocny przy diagnozie infekcji mononukleoz-ą zaka-żną.

Testy jako-ściowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwo-ści zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie mo-żna zastosowa-ć najskuteczniejsz-ą terapi-ę, a tym samym skróci-ć czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukowa-ć ryzyko wyst-ąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich -ródk-ów ma szczeg-ólne znaczenie w dobie zagro-żenia coraz wi-ększej utraty skuteczno-ści antybiotyków w efekcie obszernego i nieracjonalnego ich stosowania.

Mononukleoz-a (angina monocytowa lub gor-ączka gruczołowa), jest wywoływana przez wirus Epsteina-Barr (EBV, ang. *Epsteina-Barr virus*), nale-ż-ący do grupy wirus-ów opryszczki. Zaka-żenie nast-ępuje zazwyczaj na skutek kontaktu ze -ślin-ą chorego, atakuje -ślinianki, wywo-luje objawy grypopodobne.

Zaka-żenie EBV przenosi si-ę za pom-oc-ą -śliny i dlatego, cz-ęsto jest okre-ślane jako **choroba pocałunk-ów**. To dlatego, że najwi-ęcej zachorowa-ń na mononukleoz-ę odnotowuje si-ę w-śród m-łodzi-ęży w okresie dojrzewania, czyli w czasie pierwszych pocałunk-ów i eksperyment-ów seksualnych. Nale-ży jednak zaznaczy-ć, że równie-ż szczeg-ólnie s-ą nara-żone dzieci w wieku przedszkolnym poniew-aż mają tendencj-ę do wk-ladania do buzi wsp-ólnych zabawek. Po dostaniu si-ę do organizmu, EBV wnika do -ślinianek i tam zaczyna si-ę mno-żyć.

Pierwsze objawy choroby pojawiaj-ą si-ę dopiero po 30-50 dniach od zaka-żenia, pocz-ątkowo przypomina przezi-ębienie lub lekkie zapalenie migdałk-ów, ale w przypadku ostrego przebiegu mo-że nasuwa-ć podejrzenie anginy.

Po kilku dniach pojawiaj-ą si-ę objawy bardziej charakterystyczne dla mononukleoz-y:

- obfity katar;
- wysoka gor-ączka, do 40°C, która zwykle utrzymuje si-ę nawet dwa tygodnie;
- powi-ększone w-ęzły chłonne w pachwinach, pod pachami, na szyi i pod żuchw-ą, - s-ą twarde, wra-żliwe na dotyk, mogą mie-ć wielko-ść fasoli, a czasem nawet włoskiego orzecha;
- silny ból gardła, migdałki cz-ęsto s-ą powi-ększone i wida-ć na nich szary nalot, który jest przyczyn-ą nieprzyjemnego, mdłego zapachu z ust;
- pobo-lewania brzucha spowodowane powi-ększeniem śledziony, gruczołu po-l-żonego w g-órnej cz-ęści jamy brzusznej po lewej stronie; ten objaw wyst-ępuje u 50 proc. chorych;
- czasem pojawia si-ę te-ż opuchlizna na powiekach, nasadzie nosa albo łukach brwiowych;
- wirus EBV mo-że zaatakowa-ć w-ątrob-ę, powoduj-ąc dodatkowe objawy żółtaczk-i.

W reakcji na nieprawidłowe zastosowanie antybiotyków pojawia si-ę wysypka.



---

## **Zawartość opakowania:**

- 20 testów z jednorazowymi pipetami
- 1 bufor
- 1 kontrola pozytywna
- 1 kontrola negatywna
- instrukcja obsługi