

Link do produktu: <https://redmed.pl/mononucleosis-mononukleoz-a-test-kasetowy-przeciwcia-l-wirusa-epstein-barr-ebv-20-szt-p-1558.html>



Mononucleosis - Mononukleoz-a - Test kasetowy przeciwcia-l wirusa Epstein-Barr (EBV) - 20 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	252003N-20
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania heterofilnych przeciwcia-l przeciw wirusowi EBV w ludzkich próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza. Test ten może być pomocny przy diagnozie infekcji mononukleozą zakaźną.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszerne-go i nieracjonalne-go ich stosowania.

Mononukleoz-a (angina monocytowa lub gorączka gruczołowa), jest wywoływana przez wirus Epsteina-Barr (EBV, *ang. Epstein-Barr virus*), należą-cy do grupy wirusów opryszczki. Zakażenie następuje zazwyczaj na skutek kontaktu ze śliną chorego, atakuje ślinianki, wywołuje objawy grypopodobne.

Zakażenie EBV przenosi się za pomocą śliny i dlatego, często jest określane jako **choroba pocałunków**. To dlatego, że najwięcej zachorowań na mononukleozę odnotowuje się wśród młodzieży w okresie dojrzewania, czyli w czasie pierwszych pocałunków i eksperymentów seksualnych. Należy jednak zaznaczyć, że również szczególnie są narażone dzieci w wieku przedszkolnym ponieważ mają tendencję do wkładania do buzi wspólne-go zabawek.

Po dostaniu się do organizmu, EBV wnika do ślinianek i tam zaczyna się mnożyć.

Pierwsze objawy choroby pojawiają się dopiero po 30-50 dniach od zakażenia, początkowo przypomina przeziębienie lub lekkie zapalenie migdałków, ale w przypadku ostrego przebiegu może nasuwać podejrzenie anginy.

Po kilku dniach pojawiają się objawy bardziej charakterystyczne dla mononukleozy:

- obfity katar;
- wysoka gorączka, do 40°C, która zwykle utrzymuje się nawet dwa tygodnie;
- powiększone węzły chłonne w pachwinach, pod pachami, na szyi i pod żuchwą, - są twarde, wrażliwe na dotyk, mogą mieć wielkość fasoli, a czasem nawet włoskiego orzecha;
- silny ból gardła, migdałki często są powiększone i widać na nich szary nalot, który jest przyczyną nieprzyjemnego, mdłego zapachu z ust;
- pobolewania brzucha spowodowane powiększeniem śledziony, gruczołu położonego w górnej części jamy brzusznej po lewej stronie; ten objaw występuje u 50 proc. chorych;
- czasem pojawia się też opuchlizna na powiekach, nasadzie nosa albo łukach brwiowych;
- wirus EBV może zaatakować wątrobę, powodując dodatkowe objawy żółtaczki.

W reakcji na nieprawidłowe zastosowanie antybiotyków pojawia się wysypka.

Zawartość opakowania:

- 20 testów z jednorazowymi pipetami
- 1 bufor
- 1 kontrola pozytywna
- 1 kontrola negatywna
- instrukcja obsługi