Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:32

Link do produktu: https://redmed.pl/paski-pts-panels-kreatynina-do-cardiochek-pa-25-testow-kreatyniny-creatinine-test-25-szt-p-125.html



Paski PTS Panels Kreatynina, do CardioChek PA - 25 testów kreatyniny. Creatinine test. 25 szt.

Dostępność	**Czekamy na dostawę**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**PTS1720**
Kod producenta	**1720**
Producent	**.PTS Diagnostics**
Zadzwoń i zamów:	**+48322490070**
SKU	**BS001720**

Opis produktu

Testy paskowe działają wyłącznie z urządzeniem CardioChek PA lub CardioChek Plus. Testy pozwalają w sposób ilościowy określić poziom kreatyniny we krwi pobranej z palca lub żyły pacjenta. Niewielka kropla krwi 20 µL pozwala na przeprowadzenie badania w sposób szybki i dokładny.

Parametry techniczne:

- Zakres pomiarowy testów to 0,2 - 10 mg/dl lub 17.7-885 µmol/L (jednostkę wybieramy przed badaniem).
- Testy należy przechowywać w lodówce.
- Czas badania:

Deklaracja zgodności:

Urządzenie CardioChek PA spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").

Opcje dodatkowe:

- Pipety o pojemności 20µL, które samoistnie zasysają krew.
- jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, które dzięki specjalnej technice wykonania ostrza pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.
- Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.

Zawartość opakowania:

- 25 testów Kreatynina (CRE)
- 1 Memo Chip (procesor kalibrujący)

Zastosowanie:

Dzięki paskom testowym do badania kreatyniny, możliwe jest mierzenie jej poziomu bez konieczności korzystania z laboratorium. Mogą one być znakomitym rozwiązaniem zarówno dla wszelkich poradni nefrologicznych oraz ogólnych, ale także dla osób, które pragną samodzielnie w sposób szybki i wygodny sprawdzić stan kreatyniny w organizmie. Szybkie wykrycie podwyższonych wartości pozwala na zdecydowaną i trafną rekcję medyczną, oraz minimalizuje skutki powikłań i groźnych chorób.

Pomiar kreatyniny przed podaniem kontrastu to zmniejszone ryzyko wystąpienia nefropatii po kontrastowej (contrast induced nephropathy-CIN). CardioChek PA lub CardioChek Plus jest używany w zakładach radiologii, stacjach dializ, oddziałach onkologicznych, pracowniach diagnostyki obrazowej a zwłaszcza do oznaczania kreatyniny przed badaniem tomografii komputerowej z podaniem kontrastu lub rezonansu magnetycznego z podaniem kontrastu.

Prawidłowe wartości pomiarowe:

- mężczyźni 0,97 do 1,37 mg/dl (97-137 ml/min.)
- kobiety 0,88 do 1,28 mg/dl (88-128 ml/min)

Paski do pomiaru kreatyniny świetnie sprawdzają się w badaniach u osób z podwyższoną zawartością tego wskaźnika.

Kto powinien badać poziom kreatyniny:

- osoby z wszelkimi dysfunkcjami nerek
- osoby uprawiające intensywny wysiłek fizyczny
- osoby stosujące restrykcyjne diety
- osoby przyjmujące kortykosterydy

Co może oznaczać podwyższony poziom kreatyniny:

- ostrą niewydolność nerek:
    - przed nerkową: we wstrząsie hipoglikemicznym, we wstrząsie septycznym;
    - nerkową: przez toksyczne lub alergiczne działanie leków;
    - pozanerkową: przy zatrzymaniu moczu.
- przewlekłą niewydolność nerek:
    - przy kłębuszkowym zapalenie nerek
- prawidłową funkcję nerek:
    - przy odwodnieniu.

Co wpływa na wzrost poziomu kreatyniny:

- wysiłek fizyczny,
- akromegalia,
- gigantyzm.

Co wpływa na spadek poziomu kreatyniny:

- głodzenie,
- stosowanie kortykosterydów.