

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-pts-panels-cholglu-cholesterol-i-glukoza-cardiochek-pa-i-plus-25-sztop-panel-diabetologiczny-p-124.html>



Paski PTS Panels CHOL+GLU, Cholesterol i Glukoza CardioChek PA i Plus, 25 szt/op Panel Diabetologiczny

Cena	339,98 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	PTS1765
Kod producenta	BS001765
Kod EAN / GETIN	381931765016
Producent	.PTS Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
SKU	BS001765

Opis produktu

Testy paskowe działają wyłącznie z urządzeniem CardioChek PA i CardioChek Plus. Testy pozwalają w sposób ilościowy określić poziom dwóch parametrów krwi, w próbce krwi pobranej z palca lub żyły pacjenta. Są to: cholesterol całkowity oraz glukoza. Niewielka kropla krwi 30µL pozwala na przeprowadzenie badania w sposób szybki i dokładny.

Parametry techniczne:

- Zakresy pomiarowe testów to:
 - Cholesterol całkowity (TC)- 100-400mg/dl lub 2,59-10,36mmol/l
 - Glukoza (GLU)- 20-600 mg/dl lub 1,11-33,3mmol/l
- Testów nie należy przechowywać w lodówce.
- Czas badania:

Deklaracja zgodności: Urządzenie CardioChek PA spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").

Opcje dodatkowe:

- Pipety o pojemności 30 µL, które samoistnie zasysają krew. Pipety te są absolutnie niezbędne dla przeprowadzenia poprawnego testu cholesterol całkowity +glukoza.
- Jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, które dzięki specjalnej technice wykonania ostrza pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.
- Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.

Zawartość opakowania:

- 1 x Panel Diabetologiczny 25szt
- 1 x Memo Chip (procesor kalibrujący)

Zastosowanie:

Paski do pomiaru cholesterolu całkowitego TC oraz glukozy znakomicie sprawdzają się zarówno w placówkach medycznych jak również w laboratoriach, którym zależy na bardzo szybkiej i wygodnej obsłudze pacjenta. Testy te świetnie sprawdzają się również podczas wszelkich akcji badań wyjazdowych, typu "białe niedziele", które coraz częściej są organizowane przez przychodnie, a także podczas wizyt domowych u pacjentów. Testy cholesterol całkowity + glukoza są również znakomitą rozwiązaniem dla osób, które pragną na bieżąco badać poziom tych dwóch jakże ważnych parametrów. Mogą one samodzielnie, szybko i precyzyjnie wykonać test, który przedstawi pełne wyniki dwóch wskaźników. Wygodne opakowanie i prostota obsługi pozwalają na zabranie pasków w podróż służbową czy na wakacje.

Prawidłowe wartości pomiarowe:

- cholesterol całkowity TC: Poniżej 200 mg/dl (5,2 mmol/L)
- Glukoza: 70 - 105 mg/dl (3,9 - 5,8mmol/L)

Zbyt wysoki poziom cholesterolu u niektórych osób jest uwarunkowany genetycznie i osoby te są szczególnie narażone na wczesny rozwój chorób układu krążenia. Wysoki poziom cholesterolu w większości przypadków jest wynikiem wadliwego odżywiania, spożywania zbyt dużej ilości tłuszczów nasyconych oraz produktów zawierających cholesterol i pokrewne mu lipidy. W wątrobie organizm człowieka głównie syntetyzuje cholesterol, ale również w skórze i jelitach. Synteza cholesterolu wymaga dosyć dużego zużycia energii i dlatego około 30% jest pobierane z pokarmów. Na poziom cholesterolu w organizmie ma również wpływ aktywność przemian metabolicznych regulowanych hormonami tarczycy. Niedoczynność tarczycy powoduje wzrost poziomu cholesterolu we krwi a nadczynność jego obniżenie. Kto powinien badać poziom cholesterolu i glukozy:

- Osoby z rozpoznaną chorobą niedokrwinną serca (chorobą wieńcową, dusznicą bolesną, po zawale serca).
- Osoby, u których rodzinie występuje wysoki poziom cholesterolu lub choroba niedokrwienna serca w młodym wieku.
- Osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą typ I i II
- Osoby znajdujące się w grupie zachorowania na cukrzycę
- Osoby w wieku powyżej 35 lat z czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów.
- Osoby przyjmujące leki obniżające poziom cholesterolu.
- Osoby, które pragną profilaktycznie kontrolować stan swojego układu sercowo-naczyniowego

Jakie są przyczyny podwyższonego stężenia cholesterolu:

- zewnątrżustrojowe
 - nieprawidłowe żywienie
 - palenie tytoniu
 - mała aktywność fizyczna
 - nadmierne spożycie alkoholu
- wewnątrżustrojowe:
 - Nie poddające się modyfikacji:
 - wiek (mężczyźni powyżej 45, kobiety powyżej 55 roku życia)
 - płeć (mężczyźni , kobiety po menopauzie)
 - uwarunkowania genetyczne
 - Podlegające eliminacji i leczeniu:
 - nadciśnienie tętnicze
 - cukrzyca
 - nadwaga i otyłość
 - inne (insulinooporność- , nadmierna produkcja wolnych rodników tlenkowych, gotowość-prozakrzepowa - zwykle są to czynniki związane z występowaniem innych chorób, ocenia je ewentualnie modyfikuje lekarz)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pipety 30ul./25szt.: 1op. (+ 13,50 zł), Brak