

Link do produktu: <https://redmed.pl/ponczochy-profilaktyczne-samonosne-z-koronka-70-den-p-183.html>

## Pończochy profilaktyczne samonośne z koronką - 70 DEN

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena             | <b>29,99 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>ponczochy samonosne koronka70</b> |
| Zadzwoń i zamów: | <b>+48322490070</b>                  |

### Opis produktu

**Pończochy profilaktyczne samonośne z koronką Avicenum 70** wspomagają i poprawiają krążenie krwi. Działają zapobiegawczo przeciwko powstawaniu żylaków i cellulitu. AVICENUM 70 zapobiega okresowym obrzękom nóg, np. podczas dłuższego stania lub siedzenia oraz przy większym obciążeniu nóg. Szczególnie polecane dla osób z dziedzicznymi skłonnościami do powstawania żylaków.



Zawiera apreturę antybakteryjną i przeciwwgrzybiczą Sanitized Silver, która zawiera aktywne jony srebra, przez co zapobiega rozmnażaniu się mikroorganizmów (pleśni i bakterii); Jony te przenikają przez ścianę komórkową mikroorganizmów i ograniczają dostęp tlenu i substancji odżywczych. W ten sposób skutecznie zapobiegają ich rozmnażaniu się oraz powstawaniu kolonii, które są często odporne na zwykły cykl prania. Produkty nie zawierają nanosrebra. Zwiększa higieniczność i trwałość wyrobu. Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i uprzyjemnia codzienne noszenie pończoch.

Ucisk w okolicach kostki: 10 - 14 mmHg



**Skład:** 76 % Nylon, 24 % Lycra

#### Dostępne rozmiary:

- 25

#### Terapia kompresyjna

Terapia kompresyjna to nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłej niewydolności żyłnej, polegająca na wywieraniu na chorą kończynę ucisku, który jest najsilniejszy w okolicy stawu skokowego i stopniowo maleje w kierunku pachwiny. Powoduje to zwiększenie prędkości przepływu krwi w żyłach, poprawę wydolności zastawek, a dzięki temu zmniejszenie cofania się i zalegania krwi w żyłach powierzchownych, a więc również zmniejszenie ich średnicy. Zmniejszenie ciśnienia krwi żyłnej wpływa na poprawę stanu mikrokrążenia i zmniejszenie obrzęku.

#### Wskazania do stosowania terapii stopniowanym uciskiem:

- profilaktyka przewlekłej niewydolności żyłnej u osób z obciążeniem genetycznym
- wykonujących pracę wymagającą długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej

- leczenie żylaków kończyn dolnych we wszystkich stopniach zaawansowania, jak i innych postaci klinicznych przewlekłej niewydolności żylniej
- profilaktyka i leczenie przewlekłej niewydolności żylniej u kobiet w ciąży
- przebyte operacyjne usunięcie żylaków lub skleroterapia
- obrzęki pourazowe
- zespół pozakrzepowy.

**Kompresjoterapia - przeciwwskazania:**

- zaawansowane zaburzenia krążenia tętniczego w kończynach dolnych
- ostre zapalenie skóry i tkanki podskórnej
- świeżo zdiagnozowana zakrzepica żył głębokich

**Stosowanie pończoch uciskowych:**

- wyroby uciskowe powinny być zakładane rano, przed wstaniem z łóżka (ponieważ nogi nie są wówczas jeszcze opuchnięte) i zdejmowane na noc
- przed założeniem należy zwinąć rajstopy, pończochy czy podkolanówki i zakładać stopniowo rozwijając, uważając, żeby pięta znajdowała się we właściwym miejscu, a materiał nie był zbyt rozciągnięty lub pofałdowany
- nie wolno uszkodzić struktury materiału, np. paznokciami
- należy unikać kontaktu materiału z maściami, kremami
- powinno się wymieniać produkty uciskowe co ok. 6 miesięcy
- podczas leczenia stopniowanym uciskiem pacjenci powinni co 3 miesiące zgłaszać się do lekarza w celu oceny tętna i krążenia obwodowego, a także przeprowadzenia aktualnych pomiarów kończyn.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Kolor:** 8003

**Rozmiar:** 25