Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 03:39

Link do produktu: https://redmed.pl/ponczochy-przeciwzylakowe-z-lamowka-avicenum-360-den-p-180.html



Pończochy przeciwżylakowe z lamówką Avicenum 360 DEN

Cena	**89,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ponczochy360**
Kod EAN / GETIN	**8590072319411**
Zadzwoń i zamów:	**+48322490070**

Opis produktu

Pończochy przeciwżylakowe z lamówką Avicenum 360 DEN
Pończochy przeciwżylakowe Avicenum 360 - II klasy kompresji , zakończone lamówką z krążkami silikonu, zapobiegającymi zsuwaniu się pończoch z nogi podczas chodzenia. Przeznaczone zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Terapia kompresyjna za pomocą wyrobów II klasy kompresyjnej jest dla pacjentów z dolegliwościami żylnymi niezastąpioną metodą leczniczą. Ciśnienie w okolicy kostek dla tych wyrobów wynosi 23 - 32 mmHg. W przypadku niewydolności żylnej słabnie ścianka żyły, pogarsza się funkcjonowanie zastawek żylnych i żyły rozszerzają się. Opadający gradient ciśnienia na wyrobach II klasy kompresyjnej pomaga we wspieraniu prawidłowego funkcjonowania zastawek żylnych i stabilizuje krążenie krwi (ułatwia powrót żylny).

Skład: 60% nylon, 40% elastan Lycra

Wykończenie antybakteryjne Sanitized Silver zapewnia: ochronę przeciwko powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, ochronę przeciwko rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni na wyrobach pończochowych, dłuższą trwałość wyrobu (chroni włókno przed jego uszkodzeniem), utrzymanie równowagi biologicznej skóry, higieniczną świeżość wyrobu.

Dostępne rozmiary:


- 1D
- 1+D
- 2D
- 2K
- 2+K
- 3K

Długość nogi w przypadku pończoch A – G:

- 62 – 71 cm = K (krótkie)
- 71 - 82 cm = D (długie)

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Trzeba też precyzyjnie dobrać siłę ucisku, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

a - obwód stopy
b - obwód w kostce
b1 - obwód łydki
c - obwód pod kolanem
d - obwód nad kolanem
f - obwód uda
g - obwód uda(5 cm poniżej kroku)
t - obód pasa)



Rozmiar	1	1+	2	2+	3	3+	4	4+
a	19-25		22-28		25-31		28-34	
b	20-23		23-26		26-29		29-32	
b1	25-30		28-33		31-36		34-39	
c	32-38		35-41		38-44		41-47	
d	31-37		34-40		37-43		40-46	
e	33-39		36-42		39-45		42-48	
f	40-48	48-56	45-53	53-61	49-57	57-65	53-61	61-69
g	47-57	57-67	52-62	62-72	57-67	67-77	62-72	72-82
h	110		120			130		
t	80		90			100		

Terapia kompresyjna
Terapia kompresyjna to nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłej niewydolności żylnej, polegająca na wywieraniu na chorą kończynę ucisku, który jest najsilniejszy w okolicy stawu skokowego i stopniowo maleje w kierunku pachwiny. Powoduje to zwiększenie prędkości przepływu krwi w żyłach, poprawę wydolności zastawek, a dzięki temu zmniejszenie cofania się i zalegania krwi w żyłach powierzchownych, a więc również zmniejszenie ich średnicy. Zmniejszenie ciśnienia krwi żylnej wpływa na poprawę stanu mikrokrążenia i zmniejszenie obrzęku.
Wskazania do stosowania terapii stopniowanym uciskiem:

- profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej u osób z obciążeniem genetycznym

- wykonujących pracę wymagającą długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej
- leczenie żylaków kończyn dolnych we wszystkich stopniach zaawansowania, jak i innych postaci klinicznych przewlekłej niewydolności żylnej
- profilaktyka i leczenie przewlekłej niewydolności żylnej u kobiet w ciąży
- przebyte operacyjne usunięcie żylaków lub skleroterapia
- obrzęki pourazowe
- zespół pozakrzepowy.

Kompresjoterapia – przeciwwskazania:

- zaawansowane zaburzenia krążenia tętniczego w kończynach dolnych
- ostre zapalenie skóry i tkanki podskórnej
- świeżo zdiagnozowana zakrzepica żył głębokich

Stosowanie pończoch uciskowych:

- wyroby uciskowe powinny być zakładane rano, przed wstaniem z łóżka (ponieważ nogi nie są wówczas jeszcze opuchnięte) i zdejmowane na noc
- przed założeniem należy zwinąć rajstopy, pończochy czy podkolanówki i zakładać stopniowo rozwijając, uważając, żeby pięta znajdowała się we właściwym miejscu, a materiał nie był zbyt rozciągnięty lub pofałdowany
- nie wolno uszkodzić struktury materiału, np. paznokciami
- należy unikać kontaktu materiału z maściami, kremami
- powinno się wymieniać produkty uciskowe co ok. 6 miesięcy
- podczas leczenia stopniowanym uciskiem pacjenci powinni co 3 miesiące zgłaszać się do lekarza w celu oceny tętna i krążenia obwodowego, a także przeprowadzenia aktualnych pomiarów kończyn.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 9999
czubek otw/zam: czubek otwarty
Rozmiar: 1d+