

Link do produktu: <https://redmed.pl/poradnik-leczenie-doustnymi-lekami-przeciwwzakrzepowymi-i-domowa-kontrola-wskaznika-inr-dzienniczek-na-wyniki-inr-p-164.html>



Poradnik - Leczenie doustnymi lekami przeciwwzakrzepowymi i domowa kontrola wskaźnika INR + dzienniczek na wyniki INR

Cena	1,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Producent	Red Med
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób które będą zażywać lub zażywają leki przeciwwzakrzepowe np. Acenocumarol, Warfin, Sintrom oraz zamierzają dokonywać domowej lub laboratoryjnej kontroli wskaźnika INR.

Standardowo poradnik jest do pobrania z konta, w dziale, informacje o koncie, wybierając odpowiednie zamówienie, w wersji elektronicznej. W celu uzyskania możliwości pobrania poradnika, bez dokonywania dodatkowego zakupu, należy po dodaniu do koszyka, wersji *.pdf, wybrać opcję zapłaty, przelew bankowy lub przekaz pocztowy, i poczekać na email potwierdzający możliwość pobrania pliku, po otrzymaniu statusu zamówienia - plik do pobrania.

SPIS TREŚCI:

- Ważne praktyczne informacje dla pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwwzakrzepowymi
- Kontrola podczas leczenia przeciwwzakrzepowego?
- W jakich sytuacjach lekarz zaleca doustne leczenie przeciwwzakrzepowe?
- Migotanie przedsionków.
- Stan po wszczepieniu sztucznej zastawki serca.
- Jak długo trwa leczenie?
- Jakie doustne leki przeciwwzakrzepowe może przepisać lekarz?
- Jakie dawki leków stosować?
- Co to jest INR?
- Jaka powinna być wartość INR przy migotaniu przedsionków?
- Jaka powinna być wartość INR po wszczepieniu sztucznej zastawki serca?
- Jak często oznaczać INR?
- Jakie objawy powinny zaniepokoić pacjenta leczonego lekami przeciwwzakrzepowymi?
- W jakich sytuacjach pacjent leczony przeciwwzakrzepowo powinien porozumieć się z lekarzem?
- Co zrobić, jeśli wystąpią nie zagrażające życiu objawy krwawienia (niewielkie siniaki, krwawienie z dziąseł przy myciu zębów)?
- Co zrobić, jeśli wartość INR jest poniżej wartości terapeutycznej oczekiwanej przez lekarza lub powyżej wartości terapeutycznej oczekiwanej przez lekarza, ale bez objawów krwawienia?
- Co zrobić, jeśli wystąpi krwawienie z nosa?
- Co zrobić, jeśli wystąpią objawy zagrażającego życiu krwawienia i/lub udaru mózgu?
- Co zrobić, jeśli kobieta leczona przeciwwzakrzepowo zajdzie w ciążę?
- Co zrobić, jeśli z innych powodów zdrowotnych konieczne było zastosowanie innych leków, które mogą mieć wpływ na zachowanie się parametrów krzepnięcia (wpływ na wchłanianie leków przeciwwzakrzepowych, bezpośrednie działanie przeciwwzakrzepowe itp.)?
- Co zrobić, gdy osoba leczona doustnymi lekami przeciwwzakrzepowymi wymaga leczenia operacyjnego?
- Czy doustne leki przeciwwzakrzepowe działają szybko i krótkotrwale, czy z opóźnieniem i długotrwale?
- Czy jest skuteczny lek odwracający działanie doustnych leków przeciwwzakrzepowych w razie przedawkowania?
- Co zrobić, jeśli zapomni się jednej dawki doustnego leku przeciwwzakrzepowego?
- Czy zmiany diety mogą mieć wpływ na leczenie przeciwwzakrzepowe?

- Czy osoba leczona doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może pić alkohol?
- Czy leki dostępne bez recepty (stosowane bez porozumienia z lekarzem) mogą wpłynąć na wyniki doustnego leczenia przeciwzakrzepowego?
- Czy będąc leczonym doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi można otrzymywać wstrzyknięcia domięśniowe?
- Czy będąc leczonym doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi można uprawiać sport?
- O jakiej porze dnia należy przyjmować doustny lek przeciwzakrzepowy?
- Czy należy mieć zapas leków przeciwzakrzepowych?
- Współczesne sposoby kontrolowania INR.
- Czy należy nosić ze sobą dokument informujący o stosowanym doustnym leczeniu przeciwzakrzepowym?

Poradnik można pobrać po zalogowaniu się w panelu klienta także w wersji pdf, w zakładce do pobrania widocznej po zalogowaniu.

UWAGA!!

Jesteś lekarzem, lub właścicielem przychodni NFZ - istnieje możliwość wysyłki paczki z poradnikami jako materiały edukacyjne na koszt RedMed.